

# ジセレカ®錠を服用される方とそのご家族へ ジセレカ®錠の服用にあたって

ジセレカ®錠は、関節リウマチの炎症に関わる<sup>ジャック</sup>JAKと呼ばれるタンパク質にはたらき、炎症を抑える役割を果たすと考えられているお薬です。

ジセレカ®錠には、200mg錠と100mg錠があります



## ジセレカ®錠の服用方法

成人の場合、通常、  
200mg錠1錠を1日1回服用します。

\*100mg錠を1日1回服用の場合もあります。  
医師の指示通りに服用してください。

食事のタイミングに関係なく服用できますが、  
毎日同じ時間に服用するようにしましょう。



## ジセレカ®錠服用に際しての注意

服用を忘れたときは、気づいたらすぐに服用してください。1日服用を忘れた場合は、服用しなかった分を飛ばして、次の日に1回分だけ服用します。

のみ忘れても2回分を1度にまとめて服用しないでください。

### ワクチン接種について

- ・服用前、または服用中には生ワクチンを接種できません。  
ワクチンを接種する場合は主治医に相談してください。

### 妊娠について

- ・服用中は、妊娠を避けるために適切な避妊を行ってください。  
服用終了後も、少なくとも1月経期間中は適切な避妊を行ってください。
- ・妊娠の可能性のある場合は、主治医に相談してください。

### 男性の生殖能について

- ・男性では、生殖機能が低下するおそれがありますので、主治医に相談してください。

### 授乳について

- ・服用中は、授乳は中止してください。



ジセレカ®錠服用中に疑問に感じる事があたら、「ジセレカ®錠服用ガイドブック」を確認したり、主治医に相談しましょう。

特に、からだの調子がおかしいと感じた時は、主治医に相談してください。

ギリアド・サイエンシズ株式会社

お問い合わせ：

メディカルサポートセンター

フリーダイヤル: **0120-506-295**

9:00-17:30 (土日祝日及び会社休日を除く)

エーザイ株式会社

お問い合わせ：hhcホットライン

患者様用ダイヤル：0120-151-454

医療関係者用ダイヤル：0120-419-497

フリーダイヤル(通話無料)【平日9時～18時(土日・祝日9時～17時)】

JYS21PI0389PH  
JYS1051AKA

2021年11月作成