

## ワクチン接種について

- 服用前、または服用中には生ワクチンを接種できません。ワクチンを接種する場合は主治医に相談してください。

### memo

## 妊娠について

- 服用中は、妊娠を避けるために適切な避妊を行ってください。服用終了後も、少なくとも1月経期間中は適切な避妊を行ってください。
- 妊娠の可能性のある場合は主治医に相談してください。

## 男性の生殖能について

- 男性では、生殖機能が低下するおそれがありますので、主治医に相談してください。

## 授乳について

- 服用中は、授乳は中止してください。

このカードをお持ちの患者さんを診療される先生方へ  
このカードをお持ちの患者さんは、ジセレカ®錠を服用している患者さんが下記  
の副作用や症状を訴えた場合は、すみやかに主治医へご連絡するようお伝えください。

- ①重篤な感染症、日和見感染
- ②帯状疱疹
- ③静脈血栓塞栓症
- ④消化管穿孔
- ⑤間質性肺炎
- ⑥肝機能障害
- ⑦好中球数減少、リンパ球数減少、ヘモグロビン値減少
- ⑧B型肝炎ウイルスの再活性化
- ⑨横紋筋融解症、ミオパチー
- ⑩悪性腫瘍
- ⑪心血管系事象
- ⑫低リン血症

## ジセレカ®錠携帯カード

服用中は、常にこのカードを持ち歩いてください



このカードには、ジセレカ®錠の服用を開始する前および服用中に注意すべき重要な安全性についての情報を掲載しています。このカードを常に携帯し、必要な時には医師に提示してください。治療中は、治療に関する情報を主治医や緊急時に治療にあたる医師と共有することが大切です。



## ジセレカ<sup>®</sup>錠服用中に注意すべき症状

服用中は継続的な体調のチェックが必要となります。副作用または体調の変化を感じた場合は、主治医に報告してください。

### ①重篤な感染症、日和見感染

▶発熱、咳、痰、全身倦怠感など、風邪のような症状が続く

### ②带状疱疹

▶皮疹、痛み、しびれ、かゆみ

### ③静脈血栓塞栓症

▶突然の呼吸困難、胸の痛み／下肢のはれ、痛み、色の変化

### ④消化管穿孔

▶急な持続する腹痛、激しい腹痛、下血など

### ⑤間質性肺炎

▶痰の出ない咳、息切れ

### ⑥肝機能障害

▶黄疸、食欲不振、発疹など

### ⑦好中球数減少、リンパ球数減少

▶発熱、寒気、のどの痛みなど感染を疑う症状

#### ヘモグロビン値減少

▶顔色が悪い、疲れやすい、だるい、頭が重い、易疲労感、倦怠感、頭重感、動悸、息切れなど貧血を疑う症状

### ⑧B型肝炎ウイルスの再活性化

▶倦怠感、発熱、食欲不振、悪心・嘔吐、発疹、黄疸等の症状が急にあらわれたり、続いたりする

### ⑨横紋筋融解症、ミオパチー

▶手足や全身の筋肉痛、しびれ、尿の色が赤褐色になる

### ⑩悪性腫瘍

▶本剤との関連性は明らかではないが、悪性腫瘍の発現が報告されている

### ⑪心血管系事象

▶血液中の脂質検査値異常

### ⑫低リン血症

▶血液中のリン濃度が低値になる

ここに記載した以外の症状でも、体調の変化を感じた際には主治医に報告してください。

お名前

主治医

医療機関緊急連絡先

服用開始日

ジセレカ<sup>®</sup>錠以外に服用している薬剤